

## Анкета

### ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ.

Данное исследование – анонимное и добровольное. Если Вы согласны принять участие в исследовании, заполните, пожалуйста, анкету, подчеркнув нужное или поставив галочку в квадрате, можно написать свое мнение в пункте «другое». Вопросы не касаются проб Манту и Диаскинтеста. В тестировании могут участвовать лица старше 15 лет.

1. Ваш возраст:

до 20 лет;  21 - 55лет;  старше 50 лет;

2. Пол:  мужской;  женский;

3. Профессия:  медработник,  педагог,  священнослужитель,  
 домохозяйка,  другое \_\_\_\_\_

4. Отношение к вакцинации:

- положительное, делаю профилактические прививки своим детям и себе
- положительное, делаю прививки детям, себе некогда или другое \_\_\_\_\_
- неоднозначное, поэтому пока воздерживаюсь от прививок
- отрицательное в отношении некоторых вакцин, каких \_\_\_\_\_
- отрицательное, категорически против прививок

5. Если Вы отказываетесь о прививок укажите следующее.

5.1. Основная причина отказа от иммунизации взрослого человека:

- религиозные убеждения
- вред от прививок превышает риски заражения
- боюсь побочных эффектов
- не доверяю медицинским работникам
- не вижу необходимости
- другое \_\_\_\_\_

5.2. Основная причина отказа от иммунизации ребенка:

- религиозные убеждения
- вред от прививок превышает риски заражения
- боюсь побочных эффектов
- не доверяю медицинским работникам
- не доверяю российским вакцинам
- не доверяю импортным вакцинам
- не вижу необходимости
- считаю, что до определенного возраста ребенка прививать нельзя
- другое \_\_\_\_\_

5.3. Где Вы получаете информацию о прививках:

- из СМИ (телевидение, радио, газеты, интернет) (нужное подчеркнуть)
- в религиозных конфессиях;
- от медицинского работника;
- от знакомых;
- я не информирован (а) о необходимости прививок;
- другое \_\_\_\_\_

5.4. Знаете ли Вы, что:

- у непривитых есть высокий риск заболевания инфекциями, развития тяжелых и осложненных форм заболеваний
- существуют ограничения при трудоустройстве
- возможны ограничения при посещении детского коллектива в случае возникновения заболеваемости
- при вакцинации детей против полиомиелита живой вакциной в организованном коллективе будет рекомендовано непривитых детей вывести в другие группы (другие учреждения)

5.5. Есть ли необходимость в получении дополнительной информации о прививках, чтобы повысить уровень Ваших знаний по вакцинопрофилактике:

- нет
- да \_\_\_\_\_
  - в виде консультирования с врачом-иммунологом
  - в виде консультирования в другом медицинском учреждении
  - в виде получения информационных памяток
  - в виде возможности консультироваться на постоянно действующей «горячей линии»
  - другое мнение \_\_\_\_\_

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!